

適應症


俗稱胃藥，主用於胃酸分泌過多（如消化性潰瘍、胃炎、消化性食道炎及裂恐疝氣）所引起的酸度過高不適症狀。利用中和胃酸的能力，緩解胃酸所引起的胃脹氣、心口灼熱、消化不良等症狀；亦可預防治療潰瘍的發生。絕大多以內含鎂、鋁化合物成份為主。

用藥方式

1. 錠劑嚼碎後服用，療效更佳（配適量水併服）。
2. 若空腹服用，中和胃酸效果僅能維持約30分鐘；一般建議餐後1小時服用，可維持約3小時。
3. 胃乳使用前需振搖均勻。

副作用

1. 含鎂離子的製劑具有緩瀉作用可能引起腹瀉（腎衰竭病人可能發生高鎂血症）。
2. 含鋁及鈣離子的製劑可能引起便秘。（有胃出口阻塞的病人，須小心使用；尿毒症患者若未接受透析治療而服用含鋁製劑，可能會發生鋁離子中毒及軟骨症）。
3. 具全身性作用的制酸劑（如sodium bicarbonate、calcium carbonate）雖有很強的胃酸中和能力，但可能導致反彈性胃酸過多，干擾電解質平衡引起鹼中毒，不適合長期服用。

 **注意事項**

1. 制酸劑可能影響許多藥物的吸收，服用後1-2小時內最好不要口服其他藥物，以避免藥效降低或使病情失控。若無法避免併服時，應先服其他藥品，於2小時後再服胃藥，或詢問醫師藥師。（如強心劑、抗生素、抗黴菌劑、鐵劑）
2. 潰瘍患者應嚴格遵守服藥時間。
3. 若服用後有腹瀉、便秘、疲勞．．．其他不適症狀時，請與醫師或藥師連絡。
4. 正常情況下，鎂鋁離子幾乎不吸收，僅停留在腸胃道再從糞便排出，安全性較高，可經醫師評估後使用於孕婦。



Tel : 04-7229889

諮詢專線：04-7229886

院址：彰化市光復路53號

網址：www.sanannh.com.tw



制酸劑藥品 使用須知